

สรุปรายการยาที่มีการปรับปรุงจากประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

บัญชียาสำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข

กลุ่มที่ 1 รายการยาใหม่จำนวน 5 รายการ สรุปดังนี้

| ที่ | รายการยา | รูปแบบยา | บัญชี | เงื่อนไข |
|--|---|-------------------|-------|---|
| กลุ่มยา 2 Cardiovascular system | | | | |
| 2.5.4 Angiotensin-converting enzyme inhibitors | | | | |
| 1. | Lisinopril | tab | ค | ใช้สำหรับ post myocardial infarction |
| 2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics | | | | |
| 2. | Midodrine Hydrochloride ยากำพรั้า | tab | ค | ใช้สำหรับลดอาการ orthostatic hypotension ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน |
| กลุ่มยา 6 Sex hormones | | | | |
| 6.4.1 Female sex hormones | | | | |
| 3. | Estradiol (17 β -estradiol) | gel (เฉพาะ 0.06%) | ข | ไม่ระบุ |
| กลุ่มยา 9 Nutrition and blood | | | | |
| 9.5 Minerals | | | | |
| 4. | Iron (III) hydroxide polymaltose complex (iron polymaltose complex) | syr | ข | ใช้ในกรณีที่ใช้ ferrous sulfate drop แล้วเกิดอาการไม่พึงประสงค์ |
| กลุ่มยา 14 Immunological products and vaccines | | | | |
| 5. | Human papillomavirus vaccine ชนิด 4 สายพันธุ์ (quadrivalent) | inj | จ(1) | ใช้สำหรับโครงการขยายการให้บริการวัคซีนเอชพีวีในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.2560 ของกรมควบคุมโรคและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวิธีการใช้และการติดตามประเมินการใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้ในโครงการ |

กลุ่มที่ 2 รายการยาที่มีการคัดออกจากบัญชี จำนวน 1 รายการ สรุปดังนี้

| ที่ | รายการยา | รูปแบบยา | เหตุผลในการตัดออก |
|---|------------------|-------------------------------|---|
| กลุ่มยา 9 Nutrition and blood | | | |
| 9.6 Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers | | | |
| 1. | Potassium Iodide | tab (เฉพาะ 150 mcg as iodine) | เนื่องจากปัจจุบันไม่มียานี้จำหน่ายในท้องตลาด และในบัญชียาหลักแห่งชาติมียาอื่นให้สามารถใช้แทนได้อยู่แล้ว |

กลุ่มที่ 3 รายการยาที่มีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงจำนวน 18 รายการ สรุปดังนี้

| ที่ | กลุ่มยา/ รายการยา | รูปแบบยา | บัญชี | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
|---|----------------------------|--|-------|--|
| กลุ่มยา 1 Gastro-intestinal system | | | | |
| 1.3 Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding | | | | |
| 1. | Omeprazole sodium | sterile pwdr | ข | เพิ่มคำเตือนและข้อควรระวังดังนี้ “ห้ามให้ทางหลอดเลือดดำนานเกินกว่า 30 นาที” |
| 2. | Octreotide acetate | sterile sol (เฉพาะ 0.1 mg/ 1 ml) ยกเว้นชนิดออกฤทธิ์นาน | ง | ปรับเงื่อนไขจาก 1. ใช้สำหรับ high output pancreatic fistula 2. ใช้สำหรับ variceal bleeding ในกรณีที่มีหลักฐานว่าเป็นภาวะเลือดออกจาก portal hypertensive gastropathy โดยใช้ร่วมกับ therapeutic endoscopic intervention เป็น 1. ใช้สำหรับ high output pancreatic fistula 2. ใช้สำหรับ variceal bleeding โดยใช้ร่วมกับ therapeutic endoscopic intervention 3. ใช้ในกรณี bleeding ที่มีหลักฐานว่าเป็นภาวะเลือดออกจาก portal hypertensive gastropathy |
| กลุ่มยา 8 Malignant disease and immunosuppression | | | | |
| 8.1.2 Cytotoxic antibiotics | | | | |
| 3. | Mitoxantrone hydrochloride | sterile pwdr, sterile sol | ง | เพิ่มเงื่อนไข “ใช้กับผู้ป่วยเด็กที่เป็น relapsed/refractory acute lymphoblastic leukemia (ALL)” |

| ที่ | กลุ่มยา/ รายการยา | รูปแบบยา | บัญชี | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------|--|
| 4. | Mitomycin | sterile pwdr , sterile sol | ง | ตัดเงื่อนไข “ใช้รักษามะเร็งปอดระยะลุกลาม” ออกจากบัญชียาหลักแห่งชาติ |
| 8.1.3 Antimetabolites | | | | |
| 5. | Oxaliplatin | sterile pwdr , sterile sol | ง | เพิ่มหมายเหตุ ดังนี้ มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปว่ายาสสูตร FOLFOX มีประสิทธิผลในการเพิ่มระยะเวลาการรอดชีพ (survival benefit) ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะที่ 3 ที่มีอายุมากกว่า 75 ปี |
| 8.1.5 Other antineoplastic drugs | | | | |
| 6. | Paclitaxel | sterile sol | ง | เพิ่มเงื่อนไข ดังนี้ 1. ใช้เป็น second line treatment ใน nasopharyngeal cancer ระยะแพร่กระจายหรือกลับเป็นซ้ำ 2. ใช้สำหรับ esophageal cancer 3. ใช้เป็น first- line treatment ในการรักษา advanced cervical cancer 4. ใช้สำหรับ malignant melanoma |

| ที่ | กลุ่มยา/ รายการยา | รูปแบบยา | บัญชี | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
|--|-------------------|-------------|-------|--|
| 7. | Docetaxel | sterile sol | จ(๒) | <p>ปรับเงื่อนไขข้อ 1 จาก “ใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นหรือระยะลุกลาม ที่มีปัญหาโรคหัวใจ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3” เป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้ร่วมกับ cyclophosphamide ในการรักษาเสริมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นที่มีปัญหาโรคหัวใจ หรือ เคยได้รับยา doxorubicin แล้ว โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังประกาศกำหนด ใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลามหลังจากได้รับ doxorubicin และ paclitaxel แล้ว หรือ มีปัญหาโรคหัวใจ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังประกาศกำหนด |
| 8.3.1 Progestogens, anti-estrogens and enzyme inhibitors | | | | |
| 8. | Megestrol acetate | tab | ง | <p>เพิ่มเงื่อนไข ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้สำหรับ advanced endometrial cancer (endometrioid) โดยให้ยาจนกระทั่งมีการกำเริบของโรค ใช้สำหรับ early stage endometrial cancer ในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 40 ปี ที่เป็น well-differentiated endometrioid ซึ่งผลการตรวจ MRI ไม่พบ myometrial invasion และให้ยาไม่เกิน 1 ปี ใช้สำหรับ low grade endometrial stromal sarcoma (ESS) และให้ยาไม่เกิน 1 ปี |
| กลุ่มยา 9 Nutrition and blood | | | | |
| 9.1.2 Drugs used in hypoplastic, hemolytic and renal anemias | | | | |

| ที่ | กลุ่มยา/ รายการยา | รูปแบบยา | บัญชี | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
|---|--------------------|--|-------|--|
| 9. | Iron sucrose | sterile sol | ค | ปรับเงื่อนไขจาก “ใช้สำหรับรักษา iron deficiency anemia ในผู้ป่วย chronic kidney disease ที่ได้รับการล้างไตร่วมกับการให้ epoetin therapy” เป็น “ใช้สำหรับรักษา iron deficiency anemia ในผู้ป่วย chronic kidney disease ที่ไม่ตอบสนองต่อ iron supplement ชนิดรับประทาน” |
| 9.2 Fluids and electrolytes | | | | |
| 10. | Potassium chloride | syr (hosp), elixir (hosp), compressed tab, EC tab, sterile sol | ก | <p>1. เพิ่มรูปแบบ syr และ elixir</p> <p>2. ปรับค่าเตือนและข้อควรระวัง ข้อ 1 จาก</p> <p>1. ควรรับประทานยา potassium chloride หลังอาหารทันทีในกรณียาเม็ดควรดื่มน้ำอย่างน้อย 180 มิลลิลิตร และไม่ควรรีบนอนราบอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหลังจากรับประทานยา</p> <p>เป็น</p> <p>1. ควรรับประทานยา potassium chloride หลังอาหารทันที ในกรณียาเม็ดควรดื่มน้ำอย่างน้อย 180 มิลลิลิตร และห้ามเอนตัวนอนลงอย่างน้อย 30 นาที หลังรับประทานยาเม็ด</p> |
| 9.3 Vitamins | | | | |
| 11. | Folic acid | tab (เฉพาะ 400 mcg และ 5 mg) | ก | <p>1. เพิ่มรูปแบบ cap</p> <p>2. ปรับความแรง จาก “tab (เฉพาะ 400 mcg และ 5 mg)” เป็น “cap/tab (เฉพาะ 400-1,000 mcg และ 5 mg)”</p> |
| 12. | Vitamin E | emulsion (hosp), syr | ค | ปรับหมายเหตุจาก “ตำรับยา water-miscible vitamin E (มี emulsifier ในสูตรตำรับ เช่น polysorbate 80 เป็นต้น และใช้เป็นน้ำกระสายยา)” เป็น “รูปแบบ syrup เป็นตำรับ water miscible vitamin E” |
| 9.6 Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers | | | | |
| 13. | Ferrous fumarate | tab (เฉพาะ 65 mg as iron) | ก | <p>ปรับค่าเตือนและข้อควรระวังจาก</p> <p>“ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย” เป็น</p> <p>1. ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่มีภาวะเหล็กเกิน</p> <p>2. ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการแสดงของโรคธาลัสซีเมีย</p> |

| ที่ | กลุ่มยา/ รายการยา | รูปแบบยา | บัญชี | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง |
|----------------------|--|---|-------|--|
| 14. | Ferrous sulfate | tab (เฉพาะ 60 และ 65 mg as iron) | ก | 1.ปรับค่าเดือนและข้อควรระวังจาก “ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย” เป็น 1. ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่มีภาวะเหล็กเกิน 2. ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการแสดงของโรคธาลัสซีเมีย 2.ปรับความแรงจาก (เฉพาะ 60 และ 65 mg as iron) เป็น (เฉพาะ 60-65 mg as iron) |
| 15. | Folic acid | tab (เฉพาะ 400 mcg และ 5 mg) | ก | 1. เพิ่มรูปแบบ cap 2. ปรับความแรง จาก “tab (เฉพาะ 400 mcg และ 5 mg)” เป็น “cap/tab (เฉพาะ 400-1,000 mcg และ 5 mg)” |
| 16. | Ferrous salt + Folic acid | tab (เฉพาะ 60 mg as iron + 400 mcg) | ก | ปรับความแรงของ Ferrous salt จาก “เฉพาะ 60 mg as iron” เป็น “tab (เฉพาะ 60-65 mg as iron)” |
| 17. | Ferrous salt + Folic acid + Potassium iodide | tab (เฉพาะ 60 mg as iron + 400 mcg + 150 mcg as iodine) | ก | ปรับความแรงของ Ferrous salt จาก “เฉพาะ 60 mg as iron” เป็น “tab (เฉพาะ 60-65 mg as iron)” |
| กลุ่มยา 16 Antidotes | | | | |
| 18. | Calcium folinate (Leucovorin calcium) | cap, tab, sterile pwr, sterile sol | ง | ปรับเงื่อนไขข้อ 3 จาก “ให้ร่วมกับ fluorouracil (5-FU) ในการบำบัดมะเร็งลำไส้” เป็น “ให้ร่วมกับ fluorouracil (5-FU) ในการบำบัด gastrointestinal malignancy” |