

ตัวชี้วัด RDU ปีงบประมาณ 2562

ตัวชี้วัด	เกณฑ์	การประเมิน			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
มีคณะกรรมการขับเคลื่อน RDU ระดับโรงพยาบาล	มี	มี			
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 20 ตัวชี้วัด	มี	มี			
ตัวชี้วัด 1 ร้อยละการส่งยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	$\geq 90\%$	94.92 %			
ตัวชี้วัด 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการ PTC ในการดำเนินการสื่อสาร และส่งเสริมเพื่อนำไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	ระดับ 3	3			
ตัวชี้วัด 3 การดำเนินการในการจัดทำกลไกมาตรฐาน ฉลากยาเสริม และเอกสารข้อมูลยา ใน 13 กลุ่ม ที่มีรายละเอียดครบถ้วน	รายการยา 13 กลุ่ม	ระดับ 3			
ตัวชี้วัด 4 รายการยาที่ควรพิจารณา ตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาล	$\leq 1$ รายการ	0			
ตัวชี้วัด 5 การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อและส่งเสริมการขายยา	ระดับ 3	3			

ตัวชี้วัด	เกณฑ์	การประเมิน			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
ตัวชี้วัด 6 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก	≤ ร้อยละ 20	21.63			
ตัวชี้วัด 7 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคของจากร่างเฉียบพลัน	≤ ร้อยละ 20	44.16			
ตัวชี้วัด 8 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในขนาดแผลสดจากอุบัติเหตุ	≤ ร้อยละ 50	40.38			
ตัวชี้วัด 9 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกำหนดทางช่องคลอด	≤ ร้อยละ 15	0			
ตัวชี้วัด 10 ร้อยละของผู้ป่วยความดันเลือดสูงทั่วไป ที่ใช้ RAS blockade (ACE/ARB/Renin inhibitor) 2 ชนิดร่วมกัน ในการรักษาภาวะความดันเลือดสูง	ร้อยละ 0	0			
ตัวชี้วัด 11 ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ glibenclamide ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี หรือมี eGFR น้อยกว่า 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร	≤ ร้อยละ 5	0			
ตัวชี้วัด 12 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยา Metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอื่น เพื่อควบคุมระดับน้ำตาล โดยไม่มีข้อห้ามใช้ (ห้ามใช้หาก eGFR < 30 มล./นาที/1.73 ตร.ม)	≥ ร้อยละ 80	86.81			
ตัวชี้วัด 13 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs ซ้ำซ้อน	≤ ร้อยละ 5	0.14			
ตัวชี้วัด 14 ร้อยละของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปที่ได้รับยา NSAIDs	≤ ร้อยละ 10	0.22			
ตัวชี้วัด 15 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหัดเรื้อรังที่ได้รับยา Inhale corticosteroid	≥ ร้อยละ 80	66			
ตัวชี้วัด 16 ร้อยละของผู้ป่วยนอกสูงอายุ (>65 ปี) ที่ใช้ยาในกลุ่ม long-acting BZD	≤ ร้อยละ 5	0.87			
ตัวชี้วัด 17 จำนวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยาที่ห้ามใช้ ได้แก่ warfarin, statin, ergot	0	0			
ตัวชี้วัด 18 ร้อยละของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ครอบคลุมตามรหัสโรค ICD 10 ตาม RUA-URI) และใช้ยาต้าน histamine ชนิด Non-sedating	≤ ร้อยละ 20	2.56			

ตัวชี้วัด รพ.สต

ตัวชี้วัด	เกณฑ์	การประเมิน			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
ตัวชี้วัด 19 ร้อยละของ รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ที่มีอัตราการใช้จ่าย ปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน $\leq$ ร้อยละ20	100 %	100%			
ตัวชี้วัด 20 ร้อยละของ รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ที่มีอัตราการใช้จ่าย ปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน $\leq$ ร้อยละ20	100 %	70%			

ข้อมูลจาก Cockpit